 <p>SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS</p>		<p>Guía de formas farmacéuticas para pacientes con Disfagia (Uso exclusivo Vía Oral) Unidad de Disfagia</p>	<p>GERENCIA ÁREA SANITARIA IV</p>
Ed: 01	Fecha: Marzo/2021	Código: GPC-UD-E6.2.2-01	Página 1 de 43

Guía de formas farmacéuticas para pacientes con Disfagia

(Uso Exclusivo Vía Oral)

Unidad de Disfagia

REGISTRO DE EDICIÓN DEL DOCUMENTO		
EDITADO	REVISADO	APROBADO
<p>María Elena Gómez Álvarez. FEA UGC Farmacia</p> <p>Lucía Ordóñez Fernández. FEA UGC Farmacia</p> <p>Cristina Álvarez Asteiza. Residente UGC Farmacia</p> <p>Iván Maray Mateos. Residente UGC Farmacia</p> <p>Fecha: Abril/2020</p>	<p>Unidad de Disfagia. Laureano Alonso Calo Servicio de Calidad del HUCA.</p> <p>Fecha: Febrero/2021</p>	<p>Jose M^o Barroso Rodilla. Unidad de Disfagia.</p> <p>Fecha: Marzo /2021</p>
REGISTRO DE CAMBIOS		



 <p>SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS</p>	<p>Guía de formas farmacéuticas para pacientes con Disfagia (Uso exclusivo Vía Oral) Unidad de Disfagia</p>	<p>GERENCIA ÁREA SANITARIA IV</p>	
<p>Ed: 01</p>	<p>Fecha: Marzo/2021</p>	<p>Código: GPC-UD-E6.2.2-01</p>	<p>Página 2 de 43</p>

Tabla de contenido

Introducción	3
Objeto	3
Alcance	3
Sistemática Operacional	3
1. Formas en solución, polvo, granulado o efervescentes.	4
2. Formas en comprimidos, cápsulas...	4
Anexo: Relación de Formulas farmacéuticas para pacientes con Disfagia	6
Bibliografía	42
Componentes de la Unidad de Disfagia	43

 <p>SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS</p>	<p>Guía de formas farmacéuticas para pacientes con Disfagia (Uso exclusivo Vía Oral) Unidad de Disfagia</p>	<p>GERENCIA ÁREA SANITARIA IV</p>	
<p>Ed: 01</p>	<p>Fecha: Marzo/2021</p>	<p>Código: GPC-UD-E6.2.2-01</p>	<p>Página 3 de 43</p>

Esta guía es una herramienta de consulta para la administración de los fármacos exclusivamente Vía Oral (No aplicables a la administración por sondas).

Introducción

La disfagia o dificultad de la deglución se relaciona frecuentemente con enfermedades neurológicas y con el envejecimiento¹.

Esta patología complica procesos tan elementales como la alimentación, hidratación o la administración oral de medicamentos^{1,2}, provocando falta de adherencia, errores posológicos o manipulación incorrecta de las formas farmacéuticas al ser trituradas, fragmentadas o al ser vaciadas cápsulas que no se deben abrir. La suma de estos factores conduce a una pérdida de la eficacia terapéutica y a un incremento de los efectos adversos.

Objeto

Facilitar a los profesionales sanitarios Guías que contemplen soluciones generales e individualizadas, con alternativas a cada medicamento, a cada enfermo, a cada situación que puede verse modificada durante el curso clínico, para evitar dichos problemas.


Alcance

Este documento es de aplicación a los profesionales del Área Sanitaria IV que tratan a pacientes con Disfagia.

Sistemática Operacional

En primer lugar, es aconsejable conocer las formas farmacéuticas disponibles de cada medicamento prescrito y dar prioridad a aquellas que no requieran manipulación y puedan ser seguras para el paciente: parches, inyectables, supositorios, inhaladores o sublinguales.

En caso de ser necesaria la vía oral, se elegirán cuando sea posible, medicamentos en forma de solución oral, en polvo, granulados o efervescentes.

 <p>SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS</p>	<p>Guía de formas farmacéuticas para pacientes con Disfagia (Uso exclusivo Vía Oral) Unidad de Disfagia</p>	<p>GERENCIA ÁREA SANITARIA IV</p>	
<p>Ed: 01</p>	<p>Fecha: Marzo/2021</p>	<p>Código: GPC-UD-E6.2.2-01</p>	<p>Página 4 de 43</p>

I. Formas en solución, polvo, granulado o efervescentes.


- I.1** Si el medicamento puede mezclarse con comida, se hará con un PEQUEÑA cantidad de alimento (PURÉ, CREMA, COMPOTA...), evitando siempre los lácteos.
- I.2** Si el medicamento no se puede mezclar con alimentos, se le puede añadir a agua espesada con un módulo de espesante que permita lograr una viscosidad adecuada al paciente. En caso de comprimidos efervescentes, se recomienda disolver primero el comprimido en unos 20 mL de agua y posteriormente añadir el espesante. No debemos olvidar que algunos medicamentos pueden aumentar o disminuir la viscosidad de la solución.

2. Formas en comprimidos, cápsulas...

- 2.1. Comprimidos:** si pueden triturarse, se hará con un triturador de medicamentos para evitar la pérdida de fármaco, pudiendo a continuación mezclarlos con una PEQUEÑA cantidad de alimento (PURÉ, CREMA, COMPOTA...), evitando siempre los lácteos. Si el medicamento es incompatible con la ingesta de comida, se puede añadir a agua espesada con un módulo de espesante que permita lograr una viscosidad adecuada al paciente. En caso de comprimidos efervescentes, se recomienda disolver primero el comprimido en unos 20 mL de agua y posteriormente añadir el espesante.
- 2.2. Cápsulas:** si pueden abrirse y son compatibles con alimentos, se abrirán y se mezclará su contenido con un PEQUEÑA cantidad de alimento (PURÉ, CREMA, COMPOTA...), evitando siempre los lácteos. Si no se puede, la alternativa es añadir a agua espesada con un módulo de espesante que permite lograr una viscosidad adecuada al paciente.

Se recomienda manipular y administrar cada medicamento por separado.

Determinados medicamentos requieren precauciones especiales en el manipulador para evitar riesgos, en cuyo caso la seguridad es prioritaria (como por ejemplo fármacos orales oncológicos y hematológicos).

 <p>SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS</p>	<p>Guía de formas farmacéuticas para pacientes con Disfagia (Uso exclusivo Vía Oral) Unidad de Disfagia</p>	<p>GERENCIA ÁREA SANITARIA IV</p>
<p>Ed: 01</p>	<p>Fecha: Marzo/2021</p>	<p>Código: GPC-UD-E6.2.2-01</p>
		<p>Página 5 de 43</p>














Figura I. Algoritmo para la selección de la forma farmacéutica y método de administración. Tomada de Hernández Martín J et al¹


Abreviaturas:
Amp: Ampolla.
Cap: Cápsula.
Comp: Comprimido.
FM: Fórmula Magistral.
IM: Intramuscular.
K: Potasio.
P: Fósforo.
PA: Principio activo.
Susp oral: Suspensión oral.
UI: Unidad Internacional.










 SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS		Guía de formas farmacéuticas para pacientes con Disfagia (Uso exclusivo Vía Oral) Unidad de Disfagia	GERENCIA ÁREA SANITARIA IV
Ed: 01	Fecha: Marzo/2021	Código: GPC-UD-E6.2.2-01	Página 6 de 43


-  Triturar un comprimido.
-  Abrir una cápsula.
-  Mezclar con alimentos.
-  Mezclar con agua + espesante.

Anexo: Relación de Formulas farmacéuticas para pacientes con Disfagia


GRUPO FARMACOTERAPÉUTICO	PRINCIPIO ACTIVO	FORMA FARMACÉUTICA	INFORMACIÓN	INFORMACIÓN AL ALTA
A. APARATO DIGESTIVO Y METABOLISMO				
A02 MEDICAMENTOS PARA TRASTORNOS RELACIONADOS CON LA ACIDEZ				
A02AA COMPUESTOS DE MAGNESIO (ANTIÁCIDOS)				
A02AA04	MAGNESIO HIDRÓXIDO 	6,86 mEq/ml susp oral	Mezclar con puré, compota o crema. Es recomendable beber abundante líquido durante el día. Debido a que el medicamento tiene efecto laxante y suele manifestarse entre las 3 y 6 horas tras la administración e incluso antes, no se debe administrar al acostarse o a última hora del día a menos que la dosis sea relativamente pequeña y se administre con alimentos	
A02AD ASOCIACIÓN Y COMPLEJOS DE COMPUESTOS DE ALUMINIO, CALCIO Y MAGNESIO				
A02AD03	ALMAGATO 	1,5g sobres		Diluir los sobres en agua y mezclar con espesante
A02AH ANTIÁCIDOS CON BICARBONATO SÓDICO				
A02AH91	SODIO BICARBONATO 	1g sobres		Diluir los sobres en agua y mezclar con espesante
A02BA ANTAGONISTAS RECEPTORES H2 (ANTIÚLCERA PÉPTICA)				
A02BA02	RANITIDINA  + 	150 mg comp, FM 15 mg/ml sol oral	Utilizar la FM o triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema	Utilizar comp efervescentes. Disolver en agua y mezclar con espesante















 SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS	Guía de formas farmacéuticas para pacientes con Disfagia (Uso exclusivo Vía Oral) Unidad de Disfagia		GERENCIA ÁREA SANITARIA IV
	Ed: 01	Fecha: Marzo/2021	Código: GPC-UD-E6.2.2-01


A02BB PROSTAGLANDINAS (ANTIÚLCERA PÉPTICA)					
A02BB01	MISOPROSTOL	 + 	200 mcg comp	Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema	
A02BC INHIBIDORES DE LA BOMBA DE PROTONES (ANTIÚLCERA PÉPTICA)					
A02BC01	OMEPRAZOL	 + 	20 mg cap, FM 2 mg/ml sol oral	Abrir la cap y mezclar agua y espesante o compota de manzana o zumo de fruta espesada. No triturar los pellets o utilizar la sol oral de omeprazol 2 mg/ml y mezclar con espesante	Utilizar Lansoprazol Flas
A03 MEDICAMENTOS PARA TRASTORNOS FUNCIONALES GASTROINTESTINALES					
A03AX OTROS MEDICAMENTOS PADECIMIENTOS FUNCIONALES GASTROINTESTINALES					
A03AX13	SIMETICONA		40 mg comp masticable, 100 mg/ml gotas orales	Utilizar las gotas dispersadas en agua y mezclar con puré, compota o crema	
A03BB ALCALOIDES SEMISINTÉTICOS BELLADONA, AMINAS CUATERNARIAS					
A03BB01	BUTILESCOPOLAMINA BROMURO	 + 	10 mg gragea	Triturar las grageas y mezclar con agua y espesante	
A03FA PROPULSIVOS					
A03FA01	METOCLOPRAMIDA		10 mg comp, 1 mg/ml sol oral (Primperam)	Utilizar la solución mezclándola con espesante 15 min antes de las comidas	
A03FA PROPULSIVOS					
A03FA03	DOMPERIDONA		1 mg/ml susp oral	Utilizar la solución mezclándola con espesante 15 min antes de las comidas	
A04 ANTIEMÉTICOS Y ANTINAUSEANTES					

 <p>SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS</p>	<p>Guía de formas farmacéuticas para pacientes con Disfagia (Uso exclusivo Vía Oral) Unidad de Disfagia</p>		<p>GERENCIA ÁREA SANITARIA IV</p>
	Ed: 01	Fecha: Marzo/2021	<p>Código: GPC-UD-E6.2.2-01</p>


A04AA ANTAGONISTAS DE LA SEROTONINA (ANTIEMÉTICOS)					
A04AA01	ONDANSETRON	 + 	4 mg comp, 8 mg comp	Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema	Utilizar comp bucodispersables
A05 TERAPIA BILIAR Y HEPÁTICA					
A05AA PREPARADOS DE ÁCIDOS BILIARES					
A05AA02	URSOSESOXICÓLICO ÁCIDO	 + 	150 mg comp, 300 mg cap FM 25 mg/ml susp oral	Utilizar la FM o abrir las cápsulas y mezclar con puré, compota o crema	Abrir las cápsulas y mezclar con puré, compota o crema
A06 MEDICAMENTOS CONTRA EL ESTREÑIMIENTO					
A06AA LAXANTES LUBRICANTES Y EMOLIENTES					
A06AA01	PARAFINA LIQUIDA		15 ml sobres		Mezclar con espesante
A06AA51	PARAFINA LÍQUIDA / PICOSULFATO		15 ml sobres		Mezclar con espesante
A06AB02	BISACODILO		5 mg comp	No triturar los comp. Valorar sustituir por supositorios o cambiar por otro principio activo	
A06AC LAXANTES FORMADORES DE BOLO INTESTINAL					
A06AC01	PLANTAGO OVATA		3,5 g sobre	Disolver los sobres en agua y mezclar con agua y espesante. Administrar 30-60 min antes de las comidas	
A06AD LAXANTES OSMÓTICOS					
A06AD11	LACTULOSA		1,11 g/ml sol oral, 10g/15 ml sobre	Diluir los sobres en agua y mezclar con puré, compota o crema	
A06AD65	MACROGOL EN ASOCIACION		112 g+ 11 g sobre	Disolver en agua y mezclar con espesante	














 SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS	Guía de formas farmacéuticas para pacientes con Disfagia (Uso exclusivo Vía Oral) Unidad de Disfagia		GERENCIA ÁREA SANITARIA IV
	Ed: 01	Fecha: Marzo/2021	Código: GPC-UD-E6.2.2-01


A07 ANTIDIARREICOS, ANTIINFECCIOSOS, ANTIINFLAMATORIOS INTESTINALES					
A07AA ANTIBIÓTICOS (ANTIINFECCIOSOS INTESTINALES)					
A07AA01	NEOMICINA	 + 	500 mg comp	Triturar los comp y mezclar con agua y espesante. Administrar 15-30 min antes de las comidas	
A07AA11	RIFAXIMINA	 + 	200 mg comp	Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema	
A07DA ANTIPROPULSIVOS					
A07DA03	LOPERAMIDA	 + 	2 mg cap, 0,2 mg/ml sol oral	Utilizar sol oral o triturar los comp y mezclar con agua y espesante	Utilizar comp bucodispersables
07EA CORTICOSTEROIDES ACCIÓN LOCAL (ANTIINFLAMATORIOS INTESTINALES)					
A07EA06	BUDESONIDA	 + 	3 mg cap retard	Abrir las cap y mezclar con puré, compota o crema. No triturar ni masticar el contenido de la cap	
A07EC ÁCIDO AMINOSALICÍLICO Y DERIVADOS (ANTIINFLAMATORIOS INTESTINALES)					
A07EC01	SULFASALAZINA	 + 	500 mg comp	Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema	
A07EC02	MESALAZINA		500 mg comp, 500 mg sobres	Utilizar los sobres y mezclar con agua y espesante	
A07FA MICROORGANISMOS ANTIDIARREICOS					
A07FA01	LACTOBACILLUS REUTERI		100 MUFC comp masticable, 20 MUFC/GT gotas orales	Utilizar las gotas y mezclar con puré, compota o crema	
A10 ANTIDIABÉTICOS					
A10BA BIGUANIDAS (ANTIDIABÉTICOS ORALES)					
A10BA02	METFORMINA	 + 	850 mg comp, 1000 mg comp	Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema	













 SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS	Guía de formas farmacéuticas para pacientes con Disfagia (Uso exclusivo Vía Oral) Unidad de Disfagia		GERENCIA ÁREA SANITARIA IV
	Ed: 01	Fecha: Marzo/2021	Código: GPC-UD-E6.2.2-01


AI0BB SULFONILUREAS (ANTIDIABÉTICOS ORALES)				
A10BB09	GLICLAZIDA		30 mg comp retard	No triturar. Valorar otro antidiabético
A10BB12	GLIMEPIRIDA	 + 	2 mg comp	Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema
AI0BF INHIBIDORES ALFA GLUCOSIDASA (ANTIDIABÉTICOS ORALES)				
A10BF01	ACARBOSA	 + 	50 mg comp, 100 mg comp	Triturar los comp y mezclar con agua y espesante
AI0BG TIAZOLIDINADIONAS (ANDIABÉTICOS ORALES)				
A10BG03	PIOGLITAZONA	 + 	15 mg comp	Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema
AI0BH INHIBIDORES DE LA DIPEPTIDIL PEPTIDASA 4 (DDP4)				
A10BH01	SITAGLIPTINA		25 mg comp, 50 mg comp, 100 mg comp	No triturar los comprimidos. Valorar otro antidiabético
AI0BX OTROS ANTIDIABÉTICOS ORALES EXCLUIDOS INSULINA				
A10BX02	REPAGLINIDA	 + 	0,5 mg comp, 1 mg comp	Triturar los comp y mezclar con agua y espesante. Administrar 15 min antes de las comidas
AI1 VITAMINAS				
AI1AA MULTIVITAMINAS CON MINERALES				
A11AA03	MULTIVITAMINAS CON MINERALES	 + 	comp	No triturar. Valorar la utilización de un polivitamínico en gotas y mezclar con puré, compota o crema
AI1CA VITAMINA A SOLA				
A11CA01	RETINOL (VITAMINA A)		50.000UI cap., FM 2.500 UI/0,1mL sol oral	Utilizar la FM y mezclar con puré, compota o crema No utilizar las cápsulas. Cambiar por viales bebibles. Dispersar en zumo y mezclar con puré, compota o crema
AI1CC VITAMINA D Y ANÁLOGOS				






















 <p>SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS</p>	Guía de formas farmacéuticas para pacientes con Disfagia (Uso exclusivo Vía Oral) Unidad de Disfagia		GERENCIA ÁREA SANITARIA IV
	Ed: 01	Fecha: Marzo/2021	Código: GPC-UD-E6.2.2-01


AI1CC04	CALCITRIOL		0,25 mcg cap	Preferible emplear otro fármaco. Valorar administración vía IV	
AI1CC05	COLECALCIFEROL		2.000 UI/mL gotas	Mezclar con puré, compota o crema	
AI1CC06	CALCIFEDIOL		100 mcg 6000UI/ml gotas, 266 mcg 1,5ml amp oral	Mezclar con puré, compota, crema	
AI1DA VITAMINA B1					
AI1DA01	TIAMINA	 + 	300 mg comp, 100 mg/ml amp	Triturar los comp o administrar la ampolla mezclada con puré, compota o crema	
AI1DB VITAMINA B1 ASOCIADA CON B6 Y/O B12					
AI1DB91	VITAMINA B1+B6+B12	 + 	comp	Triturar el comp y mezclar con puré, compota o crema	
AI1HA OTRAS VITAMINAS SOLAS					
AI1HA02	PIRIDOXINA	 + 	300 mg comp	Triturar el comp y mezclar con puré, compota o crema	
AI1HA03	TOCOFEROL	 + 	50 mg cap, 200 mg cap, 100 mg amp, FM 20 mg/mL sol oral	Utilizar la FM 20 mg/ml y mezclar con puré, compota o crema	Valorar ampollas de administración IM, la extracción del contenido de las cápsulas con una jeringa produce pérdida de PA. Medicamento extranjero: 100 mg/ml
AI1JA ASOCIACIONES DE VITAMINAS					
AI1JA	RETINOL/TOCOFEROL		50.000UI/100 mg cap	No abrir las cap. Valorar cada fármaco por separado	
AI2 SUPLEMENTOS MINERALES					
AI2AA CALCIO					
A12AA01	CALCIO FOSFATO		8,3 mg Ca/mL emulsión oral	Mezclar con puré, compota o crema	
A12AA04	CALCIO CARBONATO	 + 	500 mg comp masticable	Triturar los comp y mezclar con agua y espesante. Administrar 2 horas después de los alimentos	
AI2AX CALCIO ASOCIADO A OTRAS SUSTANCIAS					

 SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS	Guía de formas farmacéuticas para pacientes con Disfagia (Uso exclusivo Vía Oral) Unidad de Disfagia		GERENCIA ÁREA SANITARIA IV
	Ed: 01	Fecha: Marzo/2021	Código: GPC-UD-E6.2.2-01


A12AX93	CALCIO CARBONATO+ COLECALCIFEROL	 + 	500 mg/400 UI comp masticable	Triturar los comp y mezclar con agua y espesante. Administrar 2 horas después de los alimentos	Utilizar comp bucodispersables. Administrar 2 horas después de los alimentos
A12BA POTASIO					
A12BA01	POTASIO CLORURO	 + 	600 mg (8 mEq K) cap.	Abrir las cap y mezclar con agua y espesante	
A12BA POTASIO					
A12BA04	POTASIO HIDROGENOCARBONATO		10mEq K comp efervescente	Disolver los comp en agua y agitar hasta finalizar efervescencia. Después mezclar con espesante	
A12CC MAGNESIO (SUPLEMENTOS MINERALES)					
A12CC08	MAGNESIO PIDOLATO		400 mg/mL sol oral	Utilizar la solución y mezclar con puré, compota o crema	
A12CX OTROS SUPLEMENTOS MINERALES					
A12CX91	FÓSFORO		800 mg P sobre	Utilizar los sobres y mezclar con puré, compota o crema	
A16 OTROS PREPARADOS APARATO DIGESTIVO Y METABOLISMO					
A16AA AMINOÁCIDOS Y DERIVADOS					
A16AA01	CARNITINA		1 g vial 10 mL bebible	Utilizar el vial y mezclar con puré, compota o crema	
A16AA04	MERCAPTAMINA	 + 	150 mg cap.	Abrir la cápsula y mezclar el contenido con puré, compota o crema. La experiencia indica que los alimentos tales como la leche, las patatas y otros alimentos con almidón parecen ser los apropiados para mezclar con el polvo. En general deben evitarse las bebidas ácidas tales como el zumo de naranja, ya que el polvo no se mezcla bien y tiende a precipitarse	
A16AA05	CARGLUTAMICO ACIDO		200 mg comp dispersables	Dispersar en agua y mezclar con espesante	
A16AA06	BETAINA		1 g polvo para sol oral	Utilizar los polvos mezclados con puré, compota o crema	
A16AX OTROS PREPARADOS APARATO DIGESTIVO Y METABOLISMO					















 SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS	Guía de formas farmacéuticas para pacientes con Disfagia (Uso exclusivo Vía Oral) Unidad de Disfagia		GERENCIA ÁREA SANITARIA IV
	Ed: 01	Fecha: Marzo/2021	Código: GPC-UD-E6.2.2-01


A16AX03	FENILBUTIRATO SODICO 	940 mg/g granulado	Utilizar el granulado y mezclar con puré, compota o crema	
A16AX04	NITISINONA  + 	2 mg cap, 5 mg cap	Abrir las cap y mezclar con puré, compota o crema	Utilizar la susp oral y mezclar con puré, compota o crema
A16AX05	ZINC ACETATO  + 	25 mg cap, FM 10mg/mL sol oral	Utilizar la FM o abrir las cápsulas y mezclar con agua y espesante. Tomar una hora antes de las comidas o dos horas después	Abrir las cápsulas y mezclar con agua y espesante. Tomar una hora antes de las comidas o dos horas después
A16AX07	SAPROPTERINA 	100 mg comp solubles	Solubilizar los comp en agua y mezclar con puré, compota o crema	
B. SANGRE Y ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS				
B01 ANTITROMBÓTICOS				
B01AA ANTAGONISTAS DE LA VITAMINA K				
B01AA03	WARFARINA  + 	1 mg comp, 3 mg comp, 5 mg comp	Triturar los comp y mezclar con agua y espesante	
B01AA07	ACENOCUMAROL  + 	1 mg comp, 4 mg comp	Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema	
B01AC INHIBIDORES DE LA AGREGACIÓN PLAQUETARIA				
B01AC04	CLOPIDOGREL  + 	75 mg comp, 300 mg comp	Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema	
B01AC05	TICLOPIDINA  + 	250 mg comp	Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema	
B01AC06	ACETILSALICILICO ACIDO 	100 mg comp, 300 mg comp,	Desleír en agua y mezclar con puré, compota o crema	Desleír en agua y mezclar con puré, compota o crema
B01AC INHIBIDORES DE LA AGREGACIÓN PLAQUETARIA				
B01AC07	DIPIRIDAMOL  + 	100 mg comp	Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema	
B01AC18	TRIFLUSAL  + 	300 mg cap	Abrir las cap y mezclar con puré, compota o crema	Utilizar Disgren 600 mg polvo para solución oral y mezclar con puré, compota o crema
B01AC22	PRASUGREL  + 	5 mg comp, 10 mg comp	Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema	

 SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS	Guía de formas farmacéuticas para pacientes con Disfagia (Uso exclusivo Vía Oral) Unidad de Disfagia		GERENCIA ÁREA SANITARIA IV
	Ed: 01	Fecha: Marzo/2021	Código: GPC-UD-E6.2.2-01


B01AC23	CILOSTAZOL 	100 mg comp	No triturar los comp	Presentaciones diferentes a Ekistol® y Pletal® se pueden triturar
B01AC24	TICAGRELOR  + 	90 mg comp	Triturar los comp y mezclar con agua y espesante	Utilizar comp bucodispersables
B01AD ENZIMAS. AGENTES ANTITROMBÓTICOS				
B01AD01	ESTREPTOQUINASA+ ESTREPTODORNASA  + 	comp	Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema	
B02 ANTIHEMORRÁGICOS				
B02 BX OTROS HEMOSTÁTICOS SISTÉMICOS				
B02BX05	ELTROMBOPAG 	25 mg comp, 50 mg comp	No triturar	
B03 ANTIANÉMICOS				
B03AA HIERRO BIVALENTE ORAL (ANTIANÉMICOS)				
B03AA01	HIERRO GLICINA SULFATO 	100 mg cap (Ferro sanol), 30 mg Fe/ml sol (Glutaferro)	Utilizar la sol y mezclar con agua y espesante.	
B03BB ÁCIDO FOLICO				
B03BB01	FÓLICO ÁCIDO  + 	5 mg comp	Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema	
C. APARATO CARDIOVASCULAR				
C01 TERAPIA DEL MIOCARDIO				
C01AA GLUCÓSIDOS DE DIGITALIS (CARDIOTERAPIA)				
C01AA05	DIGOXINA  + 	0,25 mg comp, 0,05 mg/ml sol oral	Utilizar sol oral o triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema	
C01AA08	METILDIGOXINA  + 	0,1 mg comp	Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema	

 SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS	Guía de formas farmacéuticas para pacientes con Disfagia (Uso exclusivo Vía Oral) Unidad de Disfagia		GERENCIA ÁREA SANITARIA IV
	Ed: 01	Fecha: Marzo/2021	Código: GPC-UD-E6.2.2-01


C01BC ANTIARRÍTMICOS CLASE IC				
C01BC03	PROPAFENONA	 + 	150 mg comp	Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema
C01BC04	FLECAINIDA	 + 	100 mg comp, FM 5 mg/ml susp	Utilizar la FM o triturar los comp y mezclar con agua y espesante Triturar los comp y mezclar con agua y espesante
C01BD ANTIARRÍTMICOS CLASE III				
C01BD01	AMIODARONA	 + 	200 mg comp, FM 5 mg/ml susp	Utilizar la FM o triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema.
C01BD07	DRONEDARONA		400 mg comp	No triturar los comp No triturar los comp
C01DA NITRATOS ORGÁNICOS (CARDIOTERAPIA)				
C01DA14	ISOSORBIDA MONONITRATO	 + 	20 mg comp, 40 mg comp, 50 mg comp retard	Triturar los comp de liberación normal, disolver en agua y mezclar con espesante. Administrar una hora o dos horas después de las comidas
C01DA52	NITROGLICERINA/CAFEÍNA		1/25 mg comp sublingual	Sublingual
C01EB OTROS PREPARADOS CARDIACOS				
C01EB09	UBIDECARENONA		50 mg cap	No hay información disponible
C01EB17	IVABRADINA	 + 	5 mg comp, 7,5 mg comp	Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema
C02 ANTIHIPERTENSIVOS				
C02AB METILDOPA (ANTIHIPERTENSIVOS)				
C02AB01	METILDOPA	 + 	250 mg comp	Triturar los comprimidos, disolver en agua y mezclar con espesante. Administrar una hora o dos horas después de las comida.
















 SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS	Guía de formas farmacéuticas para pacientes con Disfagia (Uso exclusivo Vía Oral) Unidad de Disfagia		GERENCIA ÁREA SANITARIA IV
	Ed: 01	Fecha: Marzo/2021	Código: GPC-UD-E6.2.2-01


C02AC AGONISTAS RECEPTORES IMIDAZOLINA (ANTIHIPERTENSIVOS)				
C02AC01	CLONIDINA	 + 	0,15 mg comp, FM 0,1 mg/ml susp	Utilizar la FM o triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema
C02CA BLOQUEANTES ALFA-ADRENÉRGICOS (ANTIHIPERTENSIVOS)				
C02CA04	DOXAZOSINA	 + 	2mg comp y 4 mg comp retard	Sustituir los comp retard por los comp de liberación convencional. Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema
C02DB DERIVADOS DE LA HIDRAZINOFTALAZINA (ANTIHIPERTENSIVOS)				
C02DB02	HIDRALAZINA	 + 	25 mg comp	Triturar los comp y mezclar con agua y espesante. Se recomienda tomar antes de las comidas
C02KX OTROS ANTIHIPERTENSIVOS				
C02KX01	BOSENTAN		125 mg comp, 62,5 mg comp	No hay datos suficientes para hacer una recomendación
C03 DIURÉTICOS				
C03AA TIAZIDAS SOLAS (DIURÉTICOS)				
C03AA03	HIDROCLOROTIAZIDA	 + 	25 mg comp	Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema
C03BA SULFONAMIDAS SOLAS (DIURÉTICOS BAJO TECHO)				
C03BA04	CLORTALIDONA	 + 	50 mg comp	Triturar los comp y mezclar con agua y espesante
C03BA11	INDAPAMIDA	 + 	1,5 mg comp retard y 2,5 mg comp	Sustituir los comp retard por los comp de liberación convencional. Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema
C03CA SULFONAMIDAS SOLAS (DIURÉTICOS ALTO TECHO)				
C03CA01	FUROSEMIDA	 + 	40 mg comp	Triturar los comp y mezclar con agua y espesante. Para mejorar la absorción, administrar con el estómago vacío, al menos 60-30 minutos antes de la ingesta o dos horas después de ella
C03CA04	TORASEMIDA	 + 	5 mg comp y 10 mg comp	Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema

 <p>SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS</p>	<p>Guía de formas farmacéuticas para pacientes con Disfagia (Uso exclusivo Vía Oral) Unidad de Disfagia</p>		<p>GERENCIA ÁREA SANITARIA IV</p>
	Ed: 01	Fecha: Marzo/2021	Código: GPC-UD-E6.2.2-01


C03DA ANTAGONISTAS DE LA ALDOSTERONA (DIURÉTICOS)					
C03DA01	ESPIRONOLACTONA	 + 	25 mg comp y 100 mg comp	Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema	
C03DA04	EPLERENONA	 + 	25 mg comp	Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema	
C03EA ASOCIACIONES DIURÉTICOS DE BAJO TECHO + AHORRADORES DE POTASIO					
C03EA01	AMILORIDA/ HIDROCLOROTIAZIDA	 + 	5/50 mg comp	Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema	
C04 VASODILADORES PERIFÉRICOS					
C04AD DERIVADOS DE LAS PURINAS (VASODILADORES PERIFÉRICOS)					
C04AD03	PENTOXIFILINA		600 mg comp recubiertos y 300 mg amp	Utilizar las ampollas y mezclar con puré, compota o crema	
C04AX OTROS VASODILADORES PERIFÉRICOS					
C04AX02	FENOXIBENZAMINA		10 mg cap	Las cápsulas son de gelatina dura y su contenido dispersa mal en agua. Valorar posibilidad de cambio de tratamiento	No recomendado
C07 BETABLOQUEANTES					
C07AA BETABLOQUEANTES NO SELECTIVOS SOLOS					
C07AA05	PROPRANOLOL	 + 	10 mg comp y 40 mg comp	Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema	Sustituir por la solución oral y mezclar con puré, compota o crema
C07AA07	SOTALOL	 + 	80 mg comp	Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema	
C07AB BETABLOQUEANTES SELECTIVOS SOLOS					
C07AB02	METOPROLOL		95 mg comp retard	No triturar. Si disponibilidad sustituir por forma convencional 100 mg, triturar y mezclar con puré, compota o crema	
C07AB03	ATENOLOL	 + 	50 mg comp	Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema	
C07AB07	BISOPROLOL	 + 	2,5 mg comp y 5 mg comp	Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema	














 SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS	Guía de formas farmacéuticas para pacientes con Disfagia (Uso exclusivo Vía Oral) Unidad de Disfagia		GERENCIA ÁREA SANITARIA IV
	Ed: 01	Fecha: Marzo/2021	Código: GPC-UD-E6.2.2-01


C07AB12	NEBIVOLOL	 + 	5 mg comp	Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema	
C07AG ALFA Y BETABLOQUEANTES					
C07AG01	LABETALOL	 + 	100 mg comp	Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema. El principio activo es fotosensible, si fuera posible, valorar cambio de tratamiento	
C07AG02	CARVEDILOL	 + 	6,25 mg comp y 25 mg comp	Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema	
C08 BLOQUEANTES DE LOS CANALES DE CALCIO					
C08CA DERIVADOS DE LA DIHIDROPIRIDINA (BLOQUEANTES CALCIO EFECTOS PRINCIPALMENTE VASCULARES)					
C08CA01	AMLODIPINO	 + 	5 mg comp y 10 mg comp	Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema	
C08CA04	NICARDIPINO		20 mg comp	No recomendado. Valorar cambio de fármaco (por ejemplo amlodipino)	No recomendado
C08CA05	NIFEDIPINO		10 mg cap, 20 mg comp retard, 30 mg y 60 mg comp oros	Utilizar las cap de 10 mg vía sublingual tras ajustar la posología. En ancianos no se recomienda estas formas de liberación inmediata por riesgo de hipotensión e isquemia miocárdica, en estos casos valorar cambio por otro fármaco (por ejemplo amlodipino)	Utilizar las cap de 10 mg vía sublingual
C08CA06	NIMODIPINO	 + 	30 mg comp	Triturar los comp y mezclar con agua y espesante. Se recomienda tomar en ayunas, fuera de las comidas	
C08DA DERIVADOS DE LA FENILALQUILAMINA (BLOQUEANTES CALCIO CARDIO-SELECTIVOS)					
C08DA01	VERAPAMILO	 + 	80 mg comp, 120 mg, 180 mg y 240 mg comp retard	Sustituir los comp retard por los comp de liberación convencional. Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema	Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema
C08DB DERIVADOS DE BENZOTIAPINA (BLOQUEANTES CALCIO CARDIO-SELECTIVOS)					
C08DB01	DILTIAZEM	 + 	60 mg comp, 120 mg y 180 mg comp retard, 90 mg, 200 mg y 300 mg cap. retard	Triturar los comp de 60 mg y mezclar con puré, compota o crema	













 <p>SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS</p>	<p>Guía de formas farmacéuticas para pacientes con Disfagia (Uso exclusivo Vía Oral) Unidad de Disfagia</p>		<p>GERENCIA ÁREA SANITARIA IV</p>
	Ed: 01	Fecha: Marzo/2021	Código: GPC-UD-E6.2.2-01


C09 ANTIHIPERTENSIVOS ACCIÓN SISTEMA RENINA-ANGIOTENSINA					
C09AA INHIBIDORES ENZIMA CONVERTASA ANGIOTENSINA SOLOS					
C09AA01	CAPTOPRIL	 + 	12,5 mg comp, 25 mg comp y 50 mg comp	Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema	
C09AA02	ENALAPRIL	 + 	5 mg comp, 10 mg comp y 20 mg comp	Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema	
C09BA INHIBIDORES ENZIMA CONVERTASA ANGIOTENSINA ASOCIADOS A DIURÉTICOS					
C09BA02	ENALAPRIL+ HIDROCLOROTIAZIDA	 + 	20/12,5 mg comp	Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema	
C09CA ANTAGONISTAS ANGIOTENSINA II SOLOS					
C09CA01	LOSARTAN	 + 	50 mg comp	Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema	
C09DA ANTAGONISTAS ANGIOTENSINA II ASOCIADOS A DIURÉTICOS					
C09DA01	LOSARTAN+ HIDROCLOROTIAZIDA	 + 	50/12,5 mg comp	Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema	
C09XA INHIBIDORES DE LA RENINA (ACCIÓN SISTEMA RENINA-ANGIOTENSINA)					
C09XA02	ALISKIREN		300 mg comp	No recomendado. Valorar cambio de fármaco (IECA o ARA II que pueda triturarse)	No recomendado
CI0 MODIFICADORES DE LOS LÍPIDOS					
CI0AA INHIBIDORES DE LA HMG-CoA REDUCTASA (MODIFICADORES LÍPIDOS)					
CI0AA01	SIMVASTATINA	 + 	10 mg, 20 mg y 40 mg comp	Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema	
CI0AA03	PRAVASTATINA	 + 	10 mg, 20 mg y 40 mg comp	Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema. Tomar preferiblemente a la noche	
CI0AA05	ATORVASTATINA	 + 	10 mg, 20 mg y 40 mg comp	Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema	

 <p>SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS</p>		<p>Guía de formas farmacéuticas para pacientes con Disfagia (Uso exclusivo Vía Oral) Unidad de Disfagia</p>	<p>GERENCIA ÁREA SANITARIA IV</p>
Ed: 01	Fecha: Marzo/2021	Código: GPC-UD-E6.2.2-01	Página 20 de 43


CI0AB FIBRATOS (MODIFICADORS LÍPIDOS)				
C10AB05	FENOFIBRATO	 + 	145 mg comp recubiertos	Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema
CI0AC SECUESTRANTES DE ÁCIDOS BILIARES (MODIFICADORES LÍPIDOS)				
C10AC01	COLESTIRAMINA		4 g sobre	Disolver el sobre en agua y mezclar con espesante. Se recomienda tomar antes de las comidas
D. DERMATOLÓGICOS				
D05 ANTIPSORIÁSICOS				
D05BB RETINOIDES PARA TRATAMIENTO DE PSORIASIS (SISTÉMICOS)				
D05BB02	ACITRETINA	 + 	10 mg cap 25 mg cap	Abri- las cap y mezclar con puré, compota o crema. Es poco soluble en agua. Fotosensible (preparar justo antes de administrar)
G. APARATO GENITO-URINARIO Y HORMONAS SEXUALES				
G02 OTROS GINECOLÓGICOS				
G02CB INHIBIDORES DE LA PROLACTINA				
G02CB01	BROMOCRIPTINA	 + 	2,5 mg comp	Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema
G02CB03	CABERGOLINA	 + 	0,5 mg comp	Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema
G03 HORMONAS SEXUALES Y MODULADORES DE APARATO GENITAL				
G03DA DERIVADOS DEL PREGNENO (PROGESTÁGENOS)				
G03DA02	MEDROXIPROGESTERONA	 + 	10 mg comp	Triturar los comp y mezclar con agua y espesante. Se recomienda tomar antes de las comidas
G03DA04	PROGESTERONA		100 mg cap	No hay datos disponibles. Valorar cambio por otro progestágeno
G04 MEDICAMENTOS UROLÓGICOS				
G04BC DISOLVENTES DE CÁLCULOS URINARIOS				
G04BC92	POTASIO CITRATO + CÍTRICO ÁCIDO		80/18 g granulado para solución oral	Mezclar el granulado con agua y espesante















 SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS	Guía de formas farmacéuticas para pacientes con Disfagia (Uso exclusivo Vía Oral) Unidad de Disfagia		GERENCIA ÁREA SANITARIA IV
	Ed: 01	Fecha: Marzo/2021	Código: GPC-UD-E6.2.2-01


G04BD MEDICAMENTOS PARA LA FRECUENCIA E INCONTINENCIA URINARIAS				
G04BD07	TOLTERODINA		4 mg cap retard	No triturar. Si disponibilidad sustituir por la forma convencional ajustando posología (misma dosis total diaria repartida cada 12 horas), triturar y mezclar con puré, compota o crema
G04BE MEDICAMENTOS USADOS EN DISFUNCIONES ERÉCTILES				
G04BE03	SILDENAFILO	 + 	20 mg comp y 10 mg/mL solución oral	Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema. Alternativamente se puede utilizar la suspensión oral
G04CA ANTAGONISTAS ALFA ADRENOCEPTORES (HIPERPLASIA PROSTÁTICA)				
G04CA02	TAMSULOSINA		0,4 mg cap retard	No recomendado. Valorar cambio por otro antagonista de receptor alfa adrenérgico
G04CB INHIBIDORES TESTOSTERONA 5-ALFA REDUCTASA (HIPERPLASIA PROSTÁTICA)				
G04CB01	FINASTERIDA	 + 	5 mg comp	Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema
H. HORMONAS SISTÉMICAS, EXCLUÍDAS HORMONAS SEXUALES				
H01 HORMONAS HIPOFISARIAS E HIPOTALÁMICAS Y ANÁLOGOS				
H01BA VASOPRESINA Y ANÁLOGOS				
H01BA02	DESMOPRESINA	 + 	0,2 mg comp	Triturar los comp y mezclar con agua y espesante. No tomar con comprimidos
H02 CORTICOSTEROIDES DE USO SISTÉMICO				
H02AA MINERALCORTICOIDES				
H02AA02	FLUDROCORTISONA	 + 	0,1 mg comp	Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema
H02AB GLUCOCORTICOIDES				
H02AB02	DEXAMETASONA	 + 	1 mg comp, 4 mg comp y 20 mg comp	Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema





















 <p>SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS</p>	Guía de formas farmacéuticas para pacientes con Disfagia (Uso exclusivo Vía Oral) Unidad de Disfagia		GERENCIA ÁREA SANITARIA IV
	Ed: 01	Fecha: Marzo/2021	Código: GPC-UD-E6.2.2-01


H02AB04	METILPREDNISOLONA	 + 	4 mg comp, 16 mg comp y 40 mg comp	Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema. Se recomienda que la dosis total diaria sea tomada por la mañana
H02AB06	PREDNISOLONA		7 mg/mL gotas orales	Utilizar la solución y mezclar con puré, compota o crema. Se recomienda repartir la dosis total en dos tomas (1 cada 12 horas)
H02AB07	PREDNISONA	 + 	5 mg comp, 10 mg comp, 30 mg comp y 50 mg comp	Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema
H02AB09	HIDROCORTISONA	 + 	20 mg comp	Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema
H03 TERAPIA DEL TIROIDES				
H03AA HORMONAS TIROIDEAS				
H03AA01	LEVOTIROXINA SÓDICA	 + 	25 mcg comp, 50 mcg comp, 75 mcg comp, 88 mcg comp, 100 mcg comp, 112 mcg comp y 137 mcg comp	Triturar los comp y mezclar con agua y espesante. Administrar en dosis única por la mañana, con el estómago vacío, media hora antes del desayuno
H03BA TIOURACILOS (ANTITIROIDEOS)				
H03BA	PROPILTIOURACILO	 + 	50 mg comp	Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema. Valorar otro agente antitiroideo. Contiene yodo-131. Se recomienda ingesta abundante de líquido y vaciar la vejiga con frecuencia para reducir la irradiación de la vejiga. Puede producir sialadenitis. Restringir contacto cercano con niños y mujeres embarazadas por periodo de tiempo apropiado
H03BB DERIVADOS IMIDAZÓLICOS SULFURADOS (ANTITIROIDEOS)				
H03BB02	TIAMAZOL	 + 	5 mg comp	Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema
H05 HOMEOSTASIA DEL CALCIO				
H05BX OTROS ANT-PARATIROIDEOS				
H05BX01	CINACALCET		30 mg comp y 60 mg comp	No triturar. Sustituir por granulado 1 mg o 2,5 mg cap para abrir
J. ANTIINFECCIOSOS DE USO SISTÉMICO				
J01 ANTIBACTERIANOS DE USO SISTÉMICO				










 <p>SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS</p>	Guía de formas farmacéuticas para pacientes con Disfagia (Uso exclusivo Vía Oral) Unidad de Disfagia		GERENCIA ÁREA SANITARIA IV
	Ed: 01	Fecha: Marzo/2021	Código: GPC-UD-E6.2.2-01


J01CA PENICILINAS DE AMPLIO ESPECTRO					
J01CA04	AMOXICILINA	 + 	500 mg cap, 750 mg comp, 500 mg sobre y 50 mg/mL susp oral	Utilizar la suspensión oral o bien abrir los sobres o triturar los comp y mezclar con puré, compota, crema	Utilizar Amoxicilina EFG comp dispersables o 250/5 ml susp oral o 1 g sobres o triturar los comp y mezclar con puré, compota, crema
J01CE PENICILINAS BETALACTAMASA SENSIBLES					
J01CE02	FENOXIMETILPENICILINA		250 mg sobre para solución oral	Disolver el sobre en agua y mezclar con espesante. Tomar en ayunas: 1 hora antes de comidas o 2 horas después de comidas	
J01CF PENICILINAS BETALACTAMASA RESISTENTES					
J01CF02	CLOXACILINA	 + 	500 mg cap y 25 mg/mL susp oral	Utilizar la suspensión oral o bien abrir las cap y mezclar con agua y espesante. Tomar en ayunas: 1 hora antes de comidas o 2 horas después de comidas	
J01CR ASOCIACIONES DE PENICILINA, INCLUIDAS INHIBIDORES BETALACTAMASA					
J01CR02	AMOXICILINA+ CLAVULÁNICO ÁCIDO	 + 	500/125 mg comp, 875/125 mg sobre y 100/12,5 mg susp oral	Utilizar la suspensión oral o bien abrir los sobres o triturar los comp y mezclar con puré, compota, crema	
J01DC CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN					
J01DC02	CEFUROXIMA	 + 	250 mg comp, 500 mg comp y 50 mg/mL susp oral	No triturar. Sustituir por la suspensión oral y mezclar con puré, compota, crema. Para su absorción óptima se recomienda tomar con alimentos.	
J01DD CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN					
J01DD08	CEFIXIMA		20 mg/mL susp oral	Utilizar la solución y mezclar con agua y espesante	
J01EC SULFONAMIDAS DE ACCIÓN INTERMEDIA (ANTIINFECIOSOS SISTÉMICOS)					
J01EC02	SULFADIAZINA	 + 	500 mg comp	Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema	
J01EE ASOCIACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIM					
J01EE01	COTRIMOXAZOL (SULFAMETOXAZOL+ TRIMETOPRIM)	 + 	400/80 mg comp y 40/8 mg/mL susp oral	Triturar los comprimidos o utilizar la suspensión y mezclar con agua y espesante	














 SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS	Guía de formas farmacéuticas para pacientes con Disfagia (Uso exclusivo Vía Oral) Unidad de Disfagia		GERENCIA ÁREA SANITARIA IV
	Ed: 01	Fecha: Marzo/2021	Código: GPC-UD-E6.2.2-01


J01FA MACRÓLIDOS (ANTIINFECCIOSOS SISTÉMICOS)					
J01FA01	ERITROMICINA		250 mg cap y 500 mg/mL susp oral	Utilizar la solución y mezclar con agua y espesante	Utilizar la solución o los sobres y mezclar con agua y espesante
J01FA09	CLARITROMICINA		250 mg comp y 500 mg comp	No triturar. Sustituir por Azitromicina suspensión	Utilizar la solución y mezclar con puré, compota o crema
J01FA10	AZITROMICINA	 + 	500 mg comp y 40 mg/mL susp oral	Triturar los comp o utilizar la suspensión oral y mezclar con puré, compota o crema	
J01FF LINCOSAMIDAS (ANTIINFECCIOSOS SISTÉMICOS)					
J01FF01	CLINDAMICINA	 + 	150 mg cap y 300 mg cap	Abrir las cap y mezclar con puré, compota o crema	
J01MA FLUOROQUINOLONAS (ANTIINFECCIOSOS SISTÉMICOS)					
J01MA02	CIPROFLOXACINO	 + 	750 mg comp, 500 mg comp y 250 mg comp	Triturar los comp y mezclar con agua y espesante	Triturar los comprimidos o Utilizar la solución y mezclar con agua y espesante
J01MA06	NORFLOXACINO	 + 	400 mg comp	Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema	
J01MA12	LEVOFLOXACINO	 + 	500 mg comp	Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema	
J01MA14	MOXIFLOXACINO	 + 	400 mg comp recub	Triturar los comp y mezclar con agua y espesante	
J01XE DERIVADOS NITROFURANO (ANTIINFECCIOSOS SISTÉMICOS)					
J01XE01	NITROFURANTOINA	 + 	50 mg comp	Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema	Utilizar la suspensión o triturar los comprimidos y mezclar con puré, compota o crema
J01XX OTROS ANTIBACTERIANOS (ANTIINFECCIOSOS SISTÉMICOS)					
J01XX01	FOSFOMICINA	 + 	500 mg cap, 3 g sobre, 50 mg/mL susp oral	Utilizar la suspensión o abrir la cap o diluir sobres y mezclar con puré, compota o crema	
J01XX08	LINEZOLID	 + 	600 mg comp 20 mg/mL susp oral	Triturar los comp o utilizar la suspensión y mezclar con puré, compota o crema	
J02 ANTIMICÓTICOS DE USO SISTÉMICO					

















 SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS	Guía de formas farmacéuticas para pacientes con Disfagia (Uso exclusivo Vía Oral) Unidad de Disfagia		GERENCIA ÁREA SANITARIA IV
	Ed: 01	Fecha: Marzo/2021	Código: GPC-UD-E6.2.2-01


J02AC DERIVADOS TRIAZÓLICOS (ANTIMICÓTICOS SISTÉMICOS)				
J02AC01	FLUCONAZOL		50 mg, cap, 100mg cap y 200 mg cap, 40 mg/mL susp oral	Utilizar la suspensión o abrir las cap y mezclar con puré, compota o crema
J02AC02	ITRACONAZOL		100 mg cap	Abrir las cap. y mezclar con puré, compota o crema
J02AC03	VORICONAZOL		50 mg, 200 mg comp, 40 mg/mL susp oral	Utilizar la suspensión o triturar los comp y mezclar con agua y espesante. Debe tomarse al menos una hora antes o una hora después de las comidas
J02AC04	POSACONAZOL		100 mg comp, 40 mg/mL susp oral	No triturar los comp. Utilizar la suspensión y mezclar con puré, compota o crema
J04 ANTIMICOBACTERIANOS				
J04AB ANTIBIÓTICOS TUBERCULOSTÁTICOS				
J04AB02	RIFAMPICINA		300 mg cap, 20 mg/mL susp oral	Utilizar la suspensión oral y mezclar con agua y espesante. Para mejorar la absorción, administrar con el estómago vacío, al menos 60-30 minutos antes de la ingesta o dos horas después de ella
J04AB04	RIFABUTINA		150 mg cap.	Utilizar la suspensión oral y mezclar con agua y espesante. Para mejorar la absorción, administrar con el estómago vacío, al menos 30 minutos antes de la ingesta o dos horas después de ella
J04AC HIDRAZIDAS (TUBERCULOSTÁTICOS)				
J04AC51	ISONIAZIDA+ PIRIDOXINA		150/25 mg comp	Triturar los comp y mezclar con agua y espesante. Se administrará por la mañana y preferentemente con el estómago vacío(al menos 30 minutos antes o 2 horas después de las comidas)
J04BA MEDICAMENTOS CONTRA LA LEPRO				
J04BA02	DAPSONA		50 mg comp	Triturar los comp y mezclar con agua y espesante
J04AK OTROS MEDICAMENTOS CONTRA LA TUBERCULOSIS				
J04AK01	PIRAZINAMIDA		250 mg comp	Triturar los comp o utilizar la Fórmula Magistral y mezclar con puré, compota o crema
















 <p>SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS</p>	Guía de formas farmacéuticas para pacientes con Disfagia (Uso exclusivo Vía Oral) Unidad de Disfagia		GERENCIA ÁREA SANITARIA IV
	Ed: 01	Fecha: Marzo/2021	Código: GPC-UD-E6.2.2-01


J04AK02	ETAMBUTOL	 + 	400 mg grageas	Triturar los comp y mezclar con agua y espesante. Para obtener concentraciones séricas elevadas, se debe administrar en una dosis única, una vez al día, preferiblemente por la mañana, antes de la comida, aunque la absorción de etambutol no se ve alterada significativamente con la administración de alimentos	Triturar los comp y mezclar con agua y espesante. Se debe administrar en una dosis única, una vez al día, preferiblemente por la mañana, antes de la comida, aunque la absorción de etambutol no se ve alterada significativamente con la administración de alimentos
J04AM ASOCIACIONES DE MEDICAMENTOS CONTRA LA TUBERCULOSIS					
J04AM02	RIFAMPICINA+ ISONIAZIDA	 + 	300/150 mg comp	Triturar los comp y mezclar con agua y espesante. Para mejorar la absorción, administrar con el estómago vacío, al menos 60-30 minutos antes de la ingesta o dos horas después de ella	
J04AM05	RIFAMPICINA+ISONIAZIDA+ PIRAZINAMIDA	 + 	120/50/300 mg comp	Triturar los comp y mezclar con agua y espesante. Para mejorar la absorción, administrar con el estómago vacío, al menos 60-30 minutos antes de la ingesta o dos horas después de ella	
J04AM06	RIFAMPICINA+PIRAZINAM+ ETAMBUTOL+ISONIAZIDA		150/75/400/275 mg comp	No recomendado. Valorar cambio por combinación de otras presentaciones	
J05 ANTIVIRALES DE USO SISTÉMICO					
J05AB NUCLEÓSIDOS/NUCLEÓTIDOS EXCLUYENDO INHIBIDORES DE LA TRANSCRIPTASA INVERSA					
J05AB01	ACICLOVIR	 + 	200 mg comp, 800 mg comp, 80 mg/mL susp oral	Triturar los comp o utilizar la suspensión y mezclar con puré, compota o crema	Utilizar los comprimidos bucodispersables
J05AB14	VALGANCICLOVIR		450 mg comp, 50 mg/mL susp oral	Utilizar la suspensión oral y mezclar con puré, compota o crema	
J05AE INHIBIDORES DE LA PROTEASA (ANTIVIRALES SISTÉMICOS)					
J05AE03	RITONAVIR		100 mg comp recub, 100 mg polvo susp oral	Utilizar la suspensión oral y mezclar con puré, compota o crema	
J05AE08	ATAZANAVIR		200 mg, 300 mg cap	Valorar cambio por otro inhibidor de la proteasa	
J05AE10	DARUNAVIR		600 mg, 800 mg comp, 100 mg/mL sol oral	Utilizar la solución oral y mezclar con puré, compota o crema	













 <p>SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS</p>		<p>Guía de formas farmacéuticas para pacientes con Disfagia (Uso exclusivo Vía Oral) Unidad de Disfagia</p>	<p>GERENCIA ÁREA SANITARIA IV</p>
Ed: 01	Fecha: Marzo/2021	Código: GPC-UD-E6.2.2-01	Página 27 de 43


J05AF INHIBIDORES DE LA TRANSCRIPTASA INVERSA-NUCLEÓTIDOS (ANTIVIRALES)				
J05AF01	ZIDOVUDINA		250 mg cap, 100 mg/mL sol oral	Utilizar la solución oral y mezclar con agua y espesante. Para mejorar la absorción, administrar con el estómago vacío, al menos 60-30 minutos antes de la ingesta o dos horas después de ella
J05AF05	LAMIVUDINA	 + 	100 mg, 150 mg, 300 mg, 10 mg/mL sol oral	Utilizar la solución o triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema
J05AF INHIBIDORES DE LA TRANSCRIPTASA INVERSA-NUCLEÓTIDOS (ANTIVIRALES)				
J05AF06	ABACAVIR	 + 	300 mg comp, 20 mg/ml sol oral	Utilizar la solución o triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema
J05AF07	TENOFOVIR DISOPROXILO	 + 	245 mg comp	Triturar los comp y mezclar con agua, zumo de naranja o uva y espesante. No tomar en ayunas
J05AF08	ADEFOVIR DIPIVOXIL		10 mg comp	No recomendado. Valorar cambio por otro inhibidor de la transcriptasa inversa
J05AF10	ENTECAVIR		0,5 mg comp	Valorar cambio por otro inhibidor de la transcriptasa inversa o combinaciones de entecavir disponibles en suspensión oral
J05AG INHIBIDORES DE LA TRANSCRIPTASA INVERSA NO NUCLEÓTIDOS (ANTIVIRALES)				
J05AG01	NEVIRAPINA		200 mg comp, 10 mg/ml susp oral	Utilizar la suspensión oral y mezclar con puré, compota o crema
J05AG03	EFAVIRENZ	 + 	600 mg comp	Triturar los comp y mezclar con agua y espesante. Para mejorar la absorción, administrar con el estómago vacío, al menos 60-30 minutos antes de la ingesta o dos horas después de ella. Tomar a la hora de acostarse para minimizar efectos adversos del sistema nervioso
J05AG04	ETRAVIRINA		200 mg comp	Disolver el comprimido en al menos 5 mL de agua (evitar agua caliente >40°C) y remover bien hasta que el agua aparezca lechosa. Añadir espesante. Tomar después de la comida
J05AG05	RILPIVIRINA		25 mg comp	Valorar cambio por otro inhibidor de la transcriptasa inversa no análogo de nucleósido
J05AG INHIBIDORES DE LA NEURAMINIDASA (ANTIVIRALES SISTÉMICOS)				
J05AH02	OSELTAMIVIR	 + 	75 mg cap, 30 mg comp, 6 mg/mL sol oral	Abrir las cap y mezclar con puré, compota o crema. Alternativamente se puede utilizar la suspensión oral

 SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS	Guía de formas farmacéuticas para pacientes con Disfagia (Uso exclusivo Vía Oral) Unidad de Disfagia		GERENCIA ÁREA SANITARIA IV
	Ed: 01	Fecha: Marzo/2021	Código: GPC-UD-E6.2.2-01


J05 AP ANTIVIRALES PARA EL TRATAMIENTO DE INFECCIONES DE VHC					
J05AP01	RIBAVIRINA	 + 	200 mg comp	Triturar los comprimidos y mezclar con puré, compota o crema	Utilizar la suspensión oral y mezclar con puré, compota o crema
J05AR ANTIVIRALES PARA EL TRATAMIENTO DE INFECCIÓN VIH EN ASOCIACIÓN					
J05AR01	ZIDOVUDINA+LAMIVUDINA	 + 	150/300 mg comp	Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema	
J05AR02	LAMIVUDINA+ABACAVIR		300/600 mg comp	Utilizar cada fármaco por separado, en presentaciones propias de cada uno	
J05AR03	EMTRICITABINA+TENOFIVIR DISOPROXILO	 + 	200/245 mg comp	Triturar los comp y mezclar con agua, zumo de naranja o uva y espesante. No tomar en ayunas	
J05AR04	ZIDOVUDINA+ LAMIVUDINA+ABACAVIR		300/150/300 mg comp	Utilizar cada fármaco por separado u otras presentaciones	
J05AR06	EMTRICITABINA+TENOFIVIR DISOPROXILO+EFAVIRENZ		200/245/600 mg comp	Utilizar cada fármaco por separado u otras presentaciones	
J05AR08	EMTRICITABINA+TENOFIVIR DISOPROXILO+RILPIVIRINA		200/245/25 mg comp	Utilizar cada fármaco por separado u otras presentaciones	
J05AR10	LOPINAVER+RITONAVIR		100/25 mg comp, 200/50 mg comp y 80/20 mg/mL sol oral	Utilizar la suspensión oral y mezclar con puré, compota o crema	
J05AR13	DOLUTEGRAVIR+ ABACAVIR+LAMIVUDINA		50/600/300 mg comp	Utilizar cada fármaco por separado u otras presentaciones	
J05AR14	DARUNAVIR+COBICISTAT		800/150 mg comp recub	No recomendado. Valorar cambio por otro inhibidor de la proteasa o combinación	
J05AR ANTIVIRALES PARA EL TRATAMIENTO DE INFECCIÓN VIH EN ASOCIACIÓN					
J05AR15	ATAZANAVIR+COBICISTAT		300/150 mg comp	No recomendado. Valorar cambio por otro inhibidor de la proteasa o combinación	
J05AR17	EMTRICITABINA/TENOFIVIR+ ALAFENAMIDA		200/25 mg comp	No hay datos disponibles. Valorar cambio por tenofovir disoproxiolo + emtricitabina	







 SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS	Guía de formas farmacéuticas para pacientes con Disfagia (Uso exclusivo Vía Oral) Unidad de Disfagia		GERENCIA ÁREA SANITARIA IV
	Ed: 01	Fecha: Marzo/2021	Código: GPC-UD-E6.2.2-01


J05AR18	EMTRICITABINA+TENOFVIR ALAFENAMIDA+ELVITEGRAVIR+ COBICISTAT 	150/150/200/10 mg comp	No recomendado. Valorar cambio por otra combinación	
J05AR22	DARUNAVIR+COBICISTAT+EMTRICITABINA + TENOFVIR ALAFENAMIDA 	800/150/200/10 mg comp	No recomendado. Valorar cambio por otra combinación	
J05AX OTROS ANTIVIRALES (SISTÉMICOS)				
J05AX08	RALTEGRAVIR  + 	400 mg comp	Utilizar los comprimidos masticables de 100 mg y 25 mg. Triturar y mezclar con puré, compota o crema	
J05AX09	MARAVIROC 	150 mg comp y 300 mg comp	No recomendado. Valorar cambio de fármaco	
J05AX12	DOLUTEGRAVIR 	50 mg comp	No hay datos disponibles. Valorar cambio por otro inhibidor de la integrasa	
M. SISTEMA MÚSCULO-ESQUELÉTICO				
M01 ANTIINFLAMATORIOS Y ANTIRREUMÁTICOS				
M01AB DERIVADOS DE ÁCIDO ACÉTICO Y SUSTANCIAS RELACIONADAS				
M01AB01	INDOMETACINA 	25 mg cap	No abrir las cápsulas. Valorar vía rectal con supositorios de indometacina o bien cambio a otro AINE	No abrir las cápsulas
M01AB05	DICLOFENACO 	50 mg comp	No triturar. Valorar cambio por otro AINE	
M01AE DERIVADOS DEL ÁCIDO PROPIONICO				
M01AE01	IBUPROFENO 	400 mg comp, 600 mg comp, 20 mg/mL susp oral y 40 mg/mL susp oral	Utilizar la solución oral, comprimidos efervescentes o sobres y mezclar con puré, compota o crema. (Si se emplean comprimidos efervescentes se disolverá en agua). Evitar tomar en ayunas	
M01AE02	NAPROXENO  + 	500 mg comp	Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema	
M01AC OXICAMS				
M01AC01	PIROXICAM 	20 mg cap	No abrir las cap. Valorar otro antiinflamatorio	No abrir las cápsulas. Utilizar los comprimidos dispersables y mezclar con agua y espesante. También existen comprimidos liofilizados (flas) que se disuelven directamente en la boca
















 SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS	Guía de formas farmacéuticas para pacientes con Disfagia (Uso exclusivo Vía Oral) Unidad de Disfagia		GERENCIA ÁREA SANITARIA IV
	Ed: 01	Fecha: Marzo/2021	Código: GPC-UD-E6.2.2-01


M01CC PENICILAMINA Y AGENTES SIMILARES				
M01CC01	PENICILAMINA	 + 	250 mg cap	Abrir las cap y mezclar con agua y espesante
M03 RELAJANTES MUSCULARES				
M03BX OTROS AGENTES DE ACCIÓN CENTRAL				
M03BX01	BACLOFENO	 + 	10 mg comp, 25 mg comp	Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema
M03BX02	TIZANIDINA	 + 	2 mg comp y 4 mg comp	Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema
M04 PREPARADOS CONTRA LA GOTA				
M04AA PREPARADOS QUE INHIBEN LA PRODUCCIÓN DE ÁCIDO ÚRICO				
M04AA01	ALOPURINOL	 + 	100 mg comp y 300 mg comp	Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema
M04AA03	FEBUXOSTAT	 + 	80 mg comp recub y 120 mg comp recub	Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema
M04AA PREPARADOS QUE AUMENTAN LA ELIMINACIÓN DE ÁCIDO ÚRICO				
M04AB01	PROBENECID		250 mg comp	No hay datos disponibles
M04AC PREPARADOS SIN EFECTO SOBRE EL METABOLISMO DEL ÁCIDO ÚRICO				
M04AC01	COLCHICINA	 + 	0,5 mg comp	Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema
M04AC51	COLCHICINA+DICICLOVERINA	 + 	0,5/5 mg comp	Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema
M05 MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTOS DE ENFERMEDADES ÓSEAS				
M05BA BIFOSFONATOS				
M05BA04	ALENDRÓNICO ÁCIDO		70 mg comp semanal	No recomendado. Contraindicado en casos de anomalía esofágica y otros factores que retrasan el vaciamiento esofágico
M05BA07	RISEDRÓNICO ÁCIDO		5 mg comp y 35 mg comp semanal	No recomendado. Evitar en casos de anomalía esofágica y otros factores que retrasan el vaciamiento esofágico


















 <p>SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS</p>		<p>Guía de formas farmacéuticas para pacientes con Disfagia (Uso exclusivo Vía Oral) Unidad de Disfagia</p>	<p>GERENCIA ÁREA SANITARIA IV</p>
Ed: 01	Fecha: Marzo/2021	Código: GPC-UD-E6.2.2-01	Página 31 de 43


N. SISTEMA NERVIOSO					
N02 ANALGÉSICOS					
N02AA ALCALOIDES NATURALES DEL OPIO					
N02AA01	MORFINA		10 mg comp, 10 mg comp retard, 30 mg comp retard, 60 mg comp retard y 100 mg comp retard	Sustituir los comp retard por comprimidos de liberación rápida (misma dosis total diaria repartida cada 6 horas) o la solución oral y mezclar con puré, compota o crema. Valorar también los parches de fentanilo ajustando la dosis según tabla de conversión de opioides	Sustituir los comp retard por comprimidos de liberación rápida (misma dosis total diaria repartida cada 6 horas) o la solución oral y mezclar con puré, compota o crema
N02AX OTROS ANALGÉSICOS OPIÁCEOS					
N02AX02	TRAMADOL		50 mg cap, 100 mg comp retard, 150 mg comp retard y 100 mg/mL sol oral	Sustituir los comp retard por cápsulas de liberación normal (misma dosis total diaria repartida cada 6-8 horas) o la solución oral y mezclar con puré, compota o crema	
N02BA ÁCIDO SALICILICO Y DERIVADOS					
N02BA01	ACETILSALICÍLICO ÁCIDO		100 mg comp, 300 mg y 500 mg comp	Desleír los comp en agua y mezclar con puré, compota, crema	
N02BB PIRAZOLONAS (ANALGÉSICOS)					
N02BB02	METAMIZOL SÓDICO		575 mg cap	Utilizar las amp o abrir las cap y dispersar el contenido en puré, compota, crema	Utilizar la solución oral o abrir las cap y dispersar el contenido en puré, compota, crema
N02BE ANILIDAS (ANALGÉSICOS)					
N02BE01	PARACETAMOL		500 mg comp, 1 g sobre y 100 mg/mL gotas orales	Desleír los comp en agua y mezclar con puré, compota, crema	Utilizar la solución oral o sobre mezclado con puré, compota, crema
N02CC AGONISTAS SELECTIVOS RECEPTORES DE LA 5HT (ANTIMIGRAÑOSOS)					
N02CC01	SUMATRIPTAN		50 mg comp	No recomendado. Valorar la presentación para administración sc o nasal	
N03 ANTIEPILÉPTICOS					




 <p>SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS</p>		<p>Guía de formas farmacéuticas para pacientes con Disfagia (Uso exclusivo Vía Oral) Unidad de Disfagia</p>	<p>GERENCIA ÁREA SANITARIA IV</p>
Ed: 01	Fecha: Marzo/2021	Código: GPC-UD-E6.2.2-01	Página 32 de 43


N03AA BARBITÚRICOS Y DERIVADOS (ANTIEPILÉPTICOS)				
N03AA02	FENOBARBITAL	 + 	15 mg comp y 100 mg comp	Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema
N03AA03	PRIMIDONA		250 mg comp	Desleír los comp en agua y mezclar con puré, compota, crema
N03AB DERIVADOS DE HIDANTOINA (ANTIEPILÉPTICOS)				
N03AB02	FENITOINA	 + 	100 mg comp	Utilizar los comp. Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema
N03AD DERIVADOS DE SUCCINIMIDA (ANTIEPILÉPTICOS)				
N03AD01	ETOSUXIMIDA	 + 	250 mg cap	Abrir las cap y mezclar con puré, compota o crema
N03AE DERIVADOS DE BENZODIAZEPINA (ANTIEPILÉPTICOS)				
N03AE01	CLONAZEPAM	 + 	0,5 mg comp, 2 mg comp y 2,5 mg/mL gotas orales	Triturar los comp o utilizar la solución oral y mezclar con puré, compota o crema Utilizar la solución oral y mezclar con puré, compota o crema
N03AF DERIVADOS DE CARBOXAMIDA (ANTIEPILÉPTICOS)				
N03AF01	CARBAMAZEPINA	 + 	200 mg comp y 400 mg comp	Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema
N03AF02	OXCARBAZEPINA	 + 	300 mg comp, 600 mg comp y 60 mg/mL susp oral	Triturar los comp o utilizar la solución oral y mezclar con puré, compota o crema Utilizar la solución oral y mezclar con puré, compota o crema
N03AF04	ESLICARBAZEPINA	 + 	800 mg comp	Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema
N03AG DERIVADOS DE LOS ÁCIDOS GRASOS (ANTIEPILÉPTICOS)				


















 <p>SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS</p>	Guía de formas farmacéuticas para pacientes con Disfagia (Uso exclusivo Vía Oral) Unidad de Disfagia		GERENCIA ÁREA SANITARIA IV
	Ed: 01	Fecha: Marzo/2021	Código: GPC-UD-E6.2.2-01


N03AG01	VALPROICO ÁCIDO	 + 	200 mg comp, 300 mg comp retard, 500 mg comp, 500 mg comp retard, 200 mg/mL sol oral	Triturar los comp convencionales o utilizar la solución oral y mezclar con puré, compota, crema. Precaución, las formas crono o de liberación prolongada al sustituirse por formas convencionales se debe ajustar la dosis (la misma dosis diaria repartida cada 8 horas monitorizando niveles plasmáticos)	Utilizar la solución oral y mezclar con puré, compota o crema
N03AG04	VIGABATRINA		500 mg sobre	Utilizar los sobres y mezclar con puré, compota o crema	
N03AG06	TIAGABINA	 + 	5 mg comp recub	Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema	
N03AX OTROS ANTIEPILÉPTICOS					
N03AX09	LAMOTRIGINA		5 mg comp dispersable, 25 mg comp dispersable, 100 mg comp dispersable	Dispersar los comprimidos en agua y espesante	
N03AX11	TOPIRAMATO	 + 	15 mg cap, 25 mg comp, 100 mg comp	Abrir las cap y mezclar con puré, compota o crema. Los comp se pueden dispersar en agua aunque tarda unos 10 minutos en dispersar	Sustituir los comp recubiertos por cap. Abrir las cap y mezclar con puré, compota o crema
N03AX12	GABAPENTINA	 + 	100 mg cap, 300 mg cap, 400 mg cap, 600 mg cap	Abrir las cap y mezclar con puré, compota o crema	
N03AX14	LEVETIRACETAM	 + 	1000 mg comp, 250 mg comp, 500 mg comp, 100 mg/mL sol oral	Triturar los comp o utilizar la solución oral y mezclar con puré, compota o crema	Utilizar los sobres o solución oral y mezclar con puré, compota o crema
N03AX15	ZONISAMIDA	 + 	25 mg cap, 50 mg cap, 100 mg cap	Abrir las cap y mezclar con puré, compota o crema	
N03AX16	PREGABALINA	 + 	150 mg cap, 25 mg cap, 300 mg cap, 75 mg cap	Abrir las cap y mezclar con puré, compota o crema	
N03AX18	LACOSAMIDA		50 mg comp, 100 mg comp, 200 mg comp, 10 mg/mL sol oral	Utilizar la solución oral y mezclar con puré, crema o compota	





















 SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS	Guía de formas farmacéuticas para pacientes con Disfagia (Uso exclusivo Vía Oral) Unidad de Disfagia		GERENCIA ÁREA SANITARIA IV
	Ed: 01	Fecha: Marzo/2021	Código: GPC-UD-E6.2.2-01


N03AX22	PERAMPANEL 	4 mg comp, 6 mg comp	No recomendado
N04AA AMINAS TERCIARIAS (ANTIPARKINSONIANOS)			
N04AA01	TRIHEXIFENIDILO  + 	5 mg comp	Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema
N04AA02	BIPERIDENO  + 	2 mg comp, 4 mg comp retard	Sustituir los comp retard por comp de liberación convencional ajustando la posología (la misma dosis total diaria repartida cada 8 horas). Triturar y mezclar con puré, compota o puré
N04BA DOPA Y DERIVADOS (ANTIPARKINSONIANOS)			
N04BA02	LEVODOPA+CARBIDOPA  + 	200/50 mg comp, 250/25 mg comp, 100/25 mg comp, 100/25 mg comp retard, 200/50 mg comp retard	Sustituir los comp retard por comp de liberación convencional ajustando la posología. Triturar y mezclar con agua y espesante
N04BA03	LEVODOPA+CARBIDOPA+ ENTACAPONA  + 	50/12,5/200 mg comp, 75/18,5/200 mg comp, 100/25/200 mg comp, 125/31/200 mg comp, 150/37,5/200 mg comp, 200/50/200 mg comp	No hay uniformidad de criterios. Hay autores que sugieren posibilidad de triturar y mezclar con agua y espesante con riesgo de pérdida de estabilidad de los componentes al triturar los comprimidos
N04BB DERIVADOS DEL ADAMANTANO			
N04BB01	AMANTADINA  + 	100 mg cap	Abrir las cap y mezclar con agua y espesante. Debido a que puede provocar insomnio se recomienda tomar la última dosis varias horas antes de dormir
N04BC AGONISTAS DOPAMINÉRGICOS (ANTIPARKINSONIANOS)			
N04BC05	PRAMIPEXOL  + 	0,18 mg comp, 0,7 mg comp, 0,26 mg comp retard y 1,05 mg comp retard	Sustituir los comp retard por comprimidos de liberación inmediata (dosis total diaria repartida en 3 tomas) y mezclar con puré, compota o crema
N04BC06	CABERGOLINA  + 	1 mg comp	Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema
N04BD INHIBIDORES DE LA MONOAMINOOXIDASA (ANTIPARKINSONIANOS)			
N04BD02	RASAGILINA  + 	1 mg comp	Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema
N05 PSICOLÉPTICOS			
N05AA FENOTIAZINAS ALIFÁTICAS (ANTIPICÓTICOS)			
N05AA01	CLORPROMAZINA 	25 mg comp, 100 mg comp y 40 mg/mL gotas orales	Utilizar la solución y mezclar con espesante
N05AA02	LEVOMEPRIMAZINA 	25 mg comp, 100 mg comp y 40 mg/mL gotas orales	Utilizar la solución y mezclar con espesante























 SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS	Guía de formas farmacéuticas para pacientes con Disfagia (Uso exclusivo Vía Oral) Unidad de Disfagia		GERENCIA ÁREA SANITARIA IV
	Ed: 01	Fecha: Marzo/2021	Código: GPC-UD-E6.2.2-01


N05AD BUTIROFENONAS (ANTIPSIÓTICOS)					
N05AD01	HALOPERIDOL		2 mg/mL gotas orales	Utilizar la solución oral (gotas orales) y mezclar con puré, compota o crema	
N05AF DERIVADOS DE TIOXANTENO (ANTIPSIÓTICOS)					
N05AF05	ZUCLOPENTIXOL		20 mg/mL gotas orales	Utilizar la solución oral (gotas orales) y mezclar con puré, compota o crema	
N05AH DIAZEPINAS, OXAZEPINAS, TIAZEPINAS Y OXEPINAS (ANTIPSIÓTICOS)					
N05AH02	CLOZAPINA	 + 	25 mg comp y 100 mg comp	Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema	Utilizar comprimidos bucodispersables
N05AH03	OLANZAPINA	 + 	2,5 mg comp liberación normal, 5 mg y 10 mg comp bucodispersables	Utilizar comprimidos bucodispersables siempre que se pueda o triturar los comp de liberación normal y mezclar con puré, compota o crema	Utilizar comprimidos bucodispersables
N05AH04	QUETIAPINA	 + 	25 mg comp, 100 mg comp, 200 mg comp y 300 mg comp	Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema	
N05AH06	CLOTIAPINA	 + 	40 mg comp	Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema	
N05AL BENZAMIDAS (ANTIPSIÓTICOS)					
N05AL01	SULPIRIDA	 +  + 	50 mg cap y 200 mg comp	Triturar los comp y mezclar con agua y espesante ó Abrir las cap y mezclar con agua y espesante	
N05AL03	TIAPRIDA	 + 	100 mg comp	Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema	
N05AN LITIO (ANTIPSIÓTICOS)					
N05AN01	LITIO CARBONATO		40 mg comp	No triturar. Valorar cambio por otro antipsicótico	No triturar. Se debe cambiar por otro antipsicótico
N05AX OTROS ANTIPSIÓTICOS					
N05AX08	RISPERIDONA		1 mg comp , 3 mg comp y 1 mg/mL sol oral	Utilizar la solución oral y mezclar con puré, compota, crema	Utilizar comprimidos bucodispersables o la solución oral
N05AX12	ARIPIPAZOL		10 mg y 15 mg comp bucodispersables	Utilizar comprimidos bucodispersables	

















 <p>SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS</p>	Guía de formas farmacéuticas para pacientes con Disfagia (Uso exclusivo Vía Oral) Unidad de Disfagia		GERENCIA ÁREA SANITARIA IV
	Ed: 01	Fecha: Marzo/2021	Código: GPC-UD-E6.2.2-01


N05AX13	PALIPERIDONA		3 mg comp retard y 6 mg comp retard	No triturar. Valorar cambio por otro antipsicótico como risperidona	No triturar
N05 ANSIOLÍTICOS					
N05BA DERIVADOS DE LA BENZODIAZEPINA					
N05BA01	DIAZEPAM	 + 	5 mg comp y 10 mg comp	Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema	Utilizar la solución oral (gotas orales) y mezclar con puré, compota o crema
N05BA05	CLORAZEPATO DIPOTÁSICO	 +  + 	10 mg cap, 15 mg cap, 50 mg comp y 2,5 mg sobre pediátrico	Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema ó abrir las cap y mezclar con puré, compota o crema	
N05BA06	LORAZEPAM	 + 	1 mg comp y 5 mg comp	Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema	
N05BA DERIVADOS DE LA BENZODIAZEPINA					
N05BA08	BROMAZEPAM	 + 	1,5 mg cap y 3 mg cap	Abrir las cap y mezclar con puré, compota o crema	
N05BA09	CLOBAZAM	 + 	10 mg comp	Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema	
N05BA12	ALPRAZOLAM	 + 	0,25 mg comp, 0,5 mg comp y 1 mg comp liberación normal, 0,5 mg comp retard y 1 mg comp retard	Sustituir los comp retard por comp de liberación inmediata (en dosis dividida). Triturar y mezclar con puré, compota o crema	Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema o utilizar la solución oral (gotas orales) y mezclar con puré, compota o crema
N05BB DERIVADOS DIFENILMETANO (ANSIOLÍTICOS)					
N05BB01	HIDROXIZINA	 + 	25 mg comp y 2 mg/mL jarabe	Triturar los comp o utilizar el jarabe y mezclar con puré, compota o crema	
N05CD BENZODIAZEPINAS (HIPNÓTICOS Y SEDANTES)					
N05CD06	LORMETAZEPAM	 + 	1 mg comp y 2 mg comp	Triturar los comp y mezclar con agua y espesante. Se recomienda administrar por la noche, poco antes de acostarse	Triturar los comp o utilizar la solución oral (gotas orales) y mezclar con agua y espesante. Se recomienda administrar por la noche, poco antes de acostarse
N05CD08	MIDAZOLAM	 + 	7,5 mg comp y 5 amp, 15 amp, 50 mg amp	Triturar los comp o diluir la ampolla en 5 ml de agua y mezclar con puré, compota o crema	


















 <p>SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS</p>	Guía de formas farmacéuticas para pacientes con Disfagia (Uso exclusivo Vía Oral) Unidad de Disfagia		GERENCIA ÁREA SANITARIA IV
	Ed: 01	Fecha: Marzo/2021	Código: GPC-UD-E6.2.2-01


N05CF MEDICAMENTOS RELACIONADOS CON BENZODIAZEPINAS (HIPNÓTICOS Y SEDANTES)					
N05CF01	ZOPICLONA	 + 	7,5 mg comp	Triturar los comp y mezclar con agua y espesante. Se recomienda administrar poco antes de acostarse. Ficha técnica recomienda no triturar	Triturar los comp y mezclar con agua y espesante. Se recomienda administrar poco antes de acostarse
N05CM OTROS HIPNÓTICOS Y SEDANTES					
N05CM02	CLOMETIAZOL	 + 	192 mg cap	Extraer el contenido de las cap y mezclar con puré, compota o crema	
N06 PSICOANALÉPTICOS					
N06AA INHIBIDORES NO SELECTIVOS RECAPTACIÓN MONOAMINAS (ANTIDEPRESIVOS)					
N06AA04	CLOMIPRAMINA	 + 	10 mg comp, 25 mg comp y 75 mg comp de liberación prolongada	Sustituir los comp retard por comprimidos de liberación inmediata y mezclar con puré, compota o crema	
N06AA09	AMITRIPTILINA	 + 	10 mg comp, 25 mg comp y 75 mg comp	Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema	Triturar los comp o abrir las cap. y mezclar con puré, compota o crema
N06AA21	MAPROTILINA	 + 	25 mg comp y 75 mg comp	Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema. Se recomienda administrar en dosis única nocturna o bien repartido en dos tomas	
N06AB INHIBIDORES SELECTIVOS RECAPTACIÓN DE SEROTONINA (ANTIDEPRESIVOS)					
N06AB03	FLUOXETINA	 + 	20 mg cap y 4 mg/mL sol oral	Abrir las cap o bien utilizar la solución y mezclar con puré, compota o crema	Utilizar comp bucodispersables o bien la sol oral mezclar con puré, compota o crema
N06AB04	CITALOPRAM	 + 	20 mg comp y 30 mg comp	Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema	
N06AB05	PAROXETINA	 + 	20 mg comp	Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema	Triturar los comp o utilizar la sol oral (gotas orales) y mezclar con puré, compota o crema
N06AB06	SERTRALINA	 + 	50 mg comp y 100 mg comp	Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema	Triturar los comp o utilizar la sol oral y mezclar con puré, compota o crema
N06AG INHIBIDORES DE LA MONOAMINOOXIDASA A					
N06AG02	MOCLOBEMIDA	 + 	150 mg comp	Triturar los comp y mezclar con agua y espesante	
N06AX OTROS ANTIDEPRESIVOS					
N06AX03	MIANSERINA	 + 	10 mg comp y 30 mg comp	Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema	















 <p>SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS</p>		<p>Guía de formas farmacéuticas para pacientes con Disfagia (Uso exclusivo Vía Oral) Unidad de Disfagia</p>	<p>GERENCIA ÁREA SANITARIA IV</p>
Ed: 01	Fecha: Marzo/2021	Código: GPC-UD-E6.2.2-01	Página 38 de 43


N06AX05	TRAZODONA	 + 	100 mg comp	Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema	
N06AX11	MIRTAZAPINA		15 mg comp bucodispersables, 30 mg comp	Utilizar comp bucodispersables	
N06AX16	VENLAFAXINA	 + 	50 mg comp, 75 mg cap retard y 150 mg cap retard	Sustituir los cap retard por comprimidos de liberación inmediata (dosis total diaria repartida en 2 - 3 tomas) y mezclar con puré, compota o crema	
N06AX21	DULOXETINA	 + 	30 mg cap. y 60 mg cap	Abrir y dispersar en 10 ml bicarbonato sódico 1 M y mezclar con puré, compota o crema (no triturar el granulado)	
N06DA ANTICOLINESTERASAS (MEDICAMENTOS CONTRA LA DEMENCIA)					
N06DA02	DONEPEZILO	 + 	5 mg comp y 10 mg comp	Triturar los comp y mezclar con agua y espesante	Utilizar los comp bucodispersables
N06DA03	RIVASTIGMINA		1,5 mg cap, 3 mg cap	Cambiar a la presentación de parches transdérmicos	Utilizar la solución oral y mezclar con puré, compota o crema. Otra opción es cambiar a la presentación de parches transdérmicos
N06DA04	GALANTAMINA		8 mg cap retard	No abrir las cap. Valorar cambio por otro fármaco anticolinesterasa antidemencia	Utilizar la solución y mezclar con puré, compota o crema. Ajustar posología y administrar cada 12 horas
N06DX OTROS FÁRMACOS ANTIDEMENCIA					
N06DX01	MEMANTINA		10 mg comp y 5 mg/pulsación sol oral	Utilizar la solución oral y mezclar con puré, compota o crema	Utilizar la solución oral y mezclar con puré, compota o crema. Otra opción es el empleo de comp bucodispersables
N07 OTROS MEDICAMENTOS DE ACCIÓN SISTEMA NERVIOSO					
N07AA ANTICOLINESTERASAS (OTROS MEDICAMENTOS DE ACCIÓN SOBRE SNC)					
N07AA02	PIRIDOSTIGMINA	 + 	60 mg comp	Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema	
N07CA MEDICAMENTOS CONTRA EL VÉRTIGO					
N07CA01	BETAHISTINA	 + 	8 mg comp y 16 mg comp	Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema	Triturar los comp o utilizar la sol oral y mezclar con puré, compota o crema
N07XX OTROS MEDICAMENTOS DE ACCIÓN SOBRE SISTEMA NERVIOSO					
N07XX02	RILUZOL		50 mg comp y 5 mg/mL susp oral	Utilizar la solución y mezclar con agua y espesante	






 SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS	Guía de formas farmacéuticas para pacientes con Disfagia (Uso exclusivo Vía Oral) Unidad de Disfagia		GERENCIA ÁREA SANITARIA IV
	Ed: 01	Fecha: Marzo/2021	Código: GPC-UD-E6.2.2-01


N07XX04	OXIBUTATO SODICO (AC.HIDROXIBUTIRICO) 	500 mg/mL sol oral	Utilizar la solución y mezclar con agua y espesante. Debe tomarse por vía oral antes de acostarse y de nuevo entre 2,5 y 4 horas después. Los alimentos reducen significativamente la biodisponibilidad por lo que se debe tratar de comer varias horas (2-3) antes de acostarse	
N07XX05	AMIFAMPRIDINA  + 	10 mg comp	Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema	
N07XX06	TETRABENAZINA  + 	25 mg comp	Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema	
N07XX07	FAMPRIDINA 	10 mg comp liberación prolongada	No recomendado	No recomendado
N07XX	DIMETILFUMARATO 	120 mg cap y 240 mg cap	No recomendado. Al triturar, dividir, disolver, chupar o masticar la cápsula o el contenido de la misma rompe el recubrimiento entérico de los microcomprimidos que evita los efectos irritantes en el intestino	
P. ANTIPARASITARIOS, INSECTICIDAS Y REPELENTE				
P01 ANTIPROTOZOARIOS				
P01AB DERIVADOS DE NITROIMIDAZOL (ANTIPROTOZOARIOS)				
P01AB01	METRONIDAZOL  + 	250 mg comp y 25 mg/mL susp oral	Utilizar la susp oral o triturar los comp y mezclar con puré, compota, crema	
P01AX OTROA AMEBICIDAS Y ANTIPROTOZOARIOS				
P01AX05	MEPACRINA 	100 mg comp	No hay información disponible	
P01BA AMINOQUINOLINAS (ANTIMALÁRICOS)				
P01BA01	CLOROQUINA  + 	155 mg comp	Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema	
P01BA02	HIDROXICLOROQUINA  + 	200 mg comp	Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema	
P01BA03	PRIMAQUINA  + 	7,5 mg comp	Triturar los comp y mezclar con agua y espesante	
P01BB BIGUANIDAS (ANTIMALÁRICOS)				
P01BB51	PROGUANIL/ATOVACUONA  + 	100/250 mg comp y 25/62,5 mg comp	Triturar los comp pediátricos y mezclar con puré, compota o crema	

 <p>SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS</p>	Guía de formas farmacéuticas para pacientes con Disfagia (Uso exclusivo Vía Oral) Unidad de Disfagia		GERENCIA ÁREA SANITARIA IV
	Ed: 01	Fecha: Marzo/2021	Código: GPC-UD-E6.2.2-01

R. SISTEMA RESPIRATORIO					
R03 MEDICAMENTOS CONTRA ENFERMEDADES OBSTRUCTIVAS VIAS RESPIRATORIAS					
R03DA XANTINAS (ANTIASMATICOS SISTEMICOS)					
R03DA04	TEOFILINA		100 mg comp retard, 200 mg comp retard y 300 mg comp retard	Utilizar Eufilina amp ajustando posología (repartir dosis total diaria cada 6 h) mezclada con agua y espesante	Utilizar la solución oral o amp ajustando posología y mezclar con agua y espesante
R03DC ANTAGONISTAS RECEPTORES DEL LEUCOTRIENO (ANTIASMÁTICOS)					
R03DC03	MONTELUKAST	 + 	10 mg comp y 4 mg sobre	Triturar los comp o utilizar la presentación en sobre granulado y mezclar con puré, compota o crema	
R05 PREPARADOS PARA LA TOS Y EL RESFRIADO					
R05CB MUCOLÍTICOS					
R05CB01	ACETILCISTEINA		600 mg comp efervescente, 200 mg sobre y 100 mg sobre infantil	Disolver el sobre o comp efervescente en agua y mezclar con espesante	
R05CB06	AMBROXOL		6 mg/mL jarabe	Mezclar con puré, compota o crema	
R05DA ALCALOIDES DEL OPIO Y DERIVADOS (ANTITUSIVOS)					
R05DA04	CODEINA	 + 	28,7 mg comp y 2 mg/mL sol oral	Triturar los comp o utilizar la solución oral y mezclar con puré, compota o crema	
R05DA09	DEXTROMETORFAN		15 mg/mL gotas orales	Utilizar la solución oral y mezclar con puré, compota o crema	
R05DB OTROS SUPRESORES DE LA TOS					
R05DB21	CLOPERASTINA		3,54 mg/mL susp oral	Utilizar la suspensión oral y mezclar con puré, compota o crema	
R06 ANTIHISTAMINICOS DE USO SISTÉMICO					
R06AA DERIVADOS DE AMINOALQUIL ÉTERES (ANTIISTAMINICOS)					
R06AA59	DOXILAMINA/PIRIDOXINA		10/10 mg cap liberación prolongada	No recomendado	
R06AB ALQUILAMINAS SUSTITUIDAS (ANTIISTAMINICOS)					
R06AB02	DEXCLORFENIRAMINA	 + 	2 mg comp y 0,4 mg/m susp oral	Triturar los comp o utilizar la suspensión oral y mezclar con puré, compota o crema	
R06AX OTROS ANTIHISTAMÍNICOS PARA USO SISTÉMICO					
R06AX13	LORATADINA	 + 	10 mg comp	Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema	Utilizar jarabe o triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema


 <p>SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS</p>		<p>Guía de formas farmacéuticas para pacientes con Disfagia (Uso exclusivo Vía Oral) Unidad de Disfagia</p>	<p>GERENCIA ÁREA SANITARIA IV</p>
Ed: 01	Fecha: Marzo/2021	Código: GPC-UD-E6.2.2-01	Página 41 de 43

S. ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS				
S01 OFTALMOLÓGICOS				
S01EC INHIBIDORES DE LA ANHIDRASA CARBÓNICA (ANTIGLAUCOMA)				
S01EC01	ACETAZOLAMIDA	 + 	250 mg comp	Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema. Por su efecto diurético, si se da en dosis única se administrará por la mañana y si se administra en más de una dosis, la última se debe dar antes de las 18-20 horas para que su efecto diurético no interfiera con el descanso nocturno
V. VARIOS				
V03 TODOS LOS DEMÁS PRODUCTOS TERAPÉUTICOS				
V03AF03	FOLINATO CALCICO	 + 	15 mg comp	Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema
DIETOTERAPICOS				
DMPAA MÓDULO CON AMINOÁCIDOS				
MPAA3 MÓDULO DE L-ARGININA				
MPAA3	ARGININA ASPARTATO		7 g sobre	Utilizar los sobres y mezclar con puré, compota o crema
				Utilizar sobre o sol oral y mezclar con puré, compota o crema

 <p>SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS</p>	<p>Guía de formas farmacéuticas para pacientes con Disfagia (Uso exclusivo Vía Oral) Unidad de Disfagia</p>	<p>GERENCIA ÁREA SANITARIA IV</p>	
<p>Ed: 01</p>	<p>Fecha: Marzo/2021</p>	<p>Código: GPC-UD-E6.2.2-01</p>	<p>Página 42 de 43</p>

Bibliografía

1. Hernández Martín J, Correa Ballester M, Vial Escolano R, Forcano García M, Gómez Navarro R y González García P. Adaptación de la guía farmacoterapéutica de un hospital sociosanitario a pacientes con disfagia. *Farm Hosp.* 2013;37(3):198-208
2. Apolo-Carvajal F, González –Martínez M, Capilla Santamaría E, Cáliz -Hernández B, Cañamares-Orbis I, Martínez-Casanova N et al. Adecuación de la medicación oral en personas institucionalizadas en residencias de mayores a los que se les tritura la medicación: Estudio ADECUA. *Farm Hosp.* 2016;40(6):514-528
3. Boj Carceller, Gimeno Ballester V, Galindo Allueva M, Sanz París A. Guía de Medicación para Pacientes con Disfagia. ISBN: 978-84-88116-69-7. Dirección editorial: Profármaco2. Formación Continuada, Comunicación Científica-Técnica.
4. Nina Barnett, Paresh Parmar. How to tailor medication formulations for patients with dysphagia. *The Pharmaceutical Journal* 23 agosto 2016. <https://www.pharmaceutical-journal.com/learning/learning-article/how-to-tailor-medication-formulations-for-patients-with-dysphagia/20201498.article?firstPass=false>
5. Centro de Información Online de Medicamentos de la AEMPS: <https://cima.aemps.es/cima/publico/home.html>
6. White R, Bradnam V, 2015. *Handbook of Drug Administration via Enteral Feeding Tubes.* Gran Bretaña: Pharmaceutical Press.
7. Hospital Clínico San Carlos (Servicio de Farmacia), 2012. *Guía de Administración de Medicamentos por Sondas de Alimentación Enteral Hospital Clínico San Carlos.*
8. Open database: Fórmulas para mejorar la deglución de medicamentos (base de datos en internet). García Diaz B, Hidalgo Correas FJ, López Lunar E. Disponible en: <http://www.degluciondemedicamentos.com/>
9. Xunta de Galicia, 2018. *Guía Farmacoterapéutica de Centros Sociosanitarios.* Disponible: <https://extranet.sergas.es/catpb/Docs/cas/Publicaciones/Docs/Farmacia/PDF-2668-es.pdf>
10. García Aparicio J, Herrero Herrero JI, Moreno Gómez AM, Martínez Sotelo J, González del Valle E y Fernández de la Fuente MA. Pilotaje de un protocolo para la adecuación de la forma farmacéutica de la medicación oral al grado de disfagia, de los pacientes ingresados en un servicio de medicina interna. *Nutr. Hosp.* vol.26 no.5 Madrid sep./oct. 2011.

 <p>SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS</p>	<p>Guía de formas farmacéuticas para pacientes con Disfagia (Uso exclusivo Vía Oral) Unidad de Disfagia</p>	<p>GERENCIA ÁREA SANITARIA IV</p>
<p>Ed: 01</p>	<p>Fecha: Marzo/2021</p>	<p>Código: GPC-UD-E6.2.2-01</p>
		<p>Página 43 de 43</p>

Componentes de la Unidad de Disfagia

Cirugía Maxilofacial:

- Lucas de Villalaín Álvarez.

Críticos:

- Olga Rodríguez Madrid.

Digestivo:

- Froilán Giganto Tomé.

Endocrinología y Nutrición:

- Ceferino Martínez Faedo.
- Francisco Villazón González.

Farmacia:

- María Elena Gómez Álvarez.
- Lucía Ordóñez Fernández.

Formación Enfermería:

- Yolanda Valcárcel Álvarez.

Gestión y Cuidados de Enfermería:

- Isabel Prieto Méndez.

Medicina Intensiva:

- Lucía Viña Soria.

Medicina Interna:

- José Manuel Gómez Aguado.

Neurociencias:

- Concepción Argüelles Fernández.
- Laura Fernández Rosal.

Neurología:

- Sergio Calleja Puerta.

Nutrición y Dietética:

- Begoña Álvarez Coto.
- Blanca Nieves González González.

Oncología Radioterápica:

- Sonia Blanco Parajón.
- Ángeles de la Rúa Calderón.

ORL:

- César Álvarez Marcos.
- Elena Ardura Montes.

Pediatría - Gastroenterología Infantil:

- Juan José Díaz Martín.

Radiología:

- Helena Cigarrán Sexto.

Recursos Metodológicos:

- Carmen Fernández González.

Rehabilitación

- María José Fernández Gutiérrez.
- Mónica Garrán Díaz.
- Paloma Sirgo Rodríguez.
- José M^a Barroso Rodilla.

Rehabilitación ICTUS - HMN

- Begoña Cueto Tarno.

Calidad

- Elvira Rubín Gallinar.