

MEDICAMENTO : ALCOHOL BORICADO a saturación.

Forma farmacéutica : gotas óticas en solución.

Vía de administración : vía ótica, este medicamento debe aplicarse en el oído.

Composición por 100 ml : bórico ácido 5 g- etanol al 70% c.s.p. 100 ml

Actividad-Indicaciones : antiséptico. Se utiliza para tratar la otitis externa.

Contraindicaciones : está contraindicado en niños menores de 3 años, en caso de perforación timpánica o cuando haya heridas abiertas en la piel del interior del oído.

Precauciones : no se debe ingerir ya que es tóxico por vía oral pudiendo producirse náuseas, vómitos, dolor abdominal y de estomago, diarrea, dolor de cabeza, trastornos visuales y lesiones en los riñones.

Advertencias :

Embarazo y lactancia no debe utilizarse durante el embarazo y la lactancia sin consultar al médico.

Niños : no utilizar en menores de 3 años.

Otras: puede absorberse a través de la piel irritada o dañada, por lo que no debe administrarse en este caso.

Posología : aplicar 2 gotas, 3 veces al día.

Normas para la correcta administración : se debe inclinar la cabeza hacia el lado contrario al oído a tratar, y a continuación, dejar caer 2 gotas.

Intoxicación y sobredosis : en caso de intoxicación o sobredosis el paciente debe acudir inmediatamente a un centro médico o llamar al Servicio de Información Toxicológica, tfno . 91 562 04 20.

Conservación : protegido de la luz.

Caducidad : no utilizar después del plazo de validez o fecha de caducidad indicado en el envase.

Ref : Formulario Nacional 2003.